

# CANCRO DO PÂNCREAS



Sociedade Portuguesa  
de Gastroenterologia



A INCIDÊNCIA DO CANCRO DO PÂNCREAS TEM **AUMENTADO.**

**1400 NOVOS** CASOS ANUALMENTE EM PORTUGAL.

O DIAGNÓSTICO É HABITUALMENTE **TARDIO**, GERALMENTE NUMA FASE **AVANÇADA DA DOENÇA.**



**SOBREVIVÊNCIA AOS 5 ANOS DE 5%.**



EXISTE UMA **PREDISPOSIÇÃO FAMILIAR** PARA O CANCRO DO PÂNCREAS.



**TABAGISMO CRÔNICO** É O PRINCIPAL FATOR DE RISCO.

**INGESTÃO DE GORDURAS, OBESIDADE E SEDENTARISMO** TAMBÉM AUMENTAM O RISCO.

É HABITUALMENTE UMA **DOENÇA SILENCIOSA** ATÉ UMA FASE AVANÇADA E OS **SINTOMAS** PODEM SER **INESPECÍFICOS.**



É **FUNDAMENTAL** UMA **ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR.**

A **GASTROENTEROLOGIA** TEM UM **PAPEL CRUCIAL** NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESTA DOENÇA.